



**ИНСТРУКЦИЯ**  
по применению вакцины Эурикан DHPPI<sub>2</sub> – LR  
против чумы, аденовириозов, парвовириоза, парагриппа – 2, лептоспироза и бешенства собак  
(организация – разработчик: «Merial», Франция)

**I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ**

1. Торговое наименование: Эурикан DHPPI<sub>2</sub> – LR (Eurican DHPPI<sub>2</sub> – LR).

Международное непатентованное наименование: Вакцина против чумы, аденовириозов, парвовириоза, парагриппа-2, лептоспироза и бешенства собак.

2. Лекарственная форма: сухой компонент (Эурикан DHPPI<sub>2</sub>) – лиофилизированная масса; жидкий компонент (Эурикан-LR) – суспензия для инъекций.

Сухой компонент (Эурикан DHPPI<sub>2</sub>) изготовлен из культуральных жидкостей клеточных культур, инфицированных аттенуированными штаммами вируса чумы плотоядных, аденовируса CAV 2, парвовируса и вируса парагриппа-2 собак, с добавлением в качестве стабилизаторов полипептидов (22,5 мг/доза) и глюкозидов (77,5 мг/доза).

Жидкий компонент (Эурикан-LR) изготовлен из суспензии лептоспир серогрупп *Leptospira icterohaemorrhagiae* и *Leptospira canicola*, инактивированных тиомерсалом, гликопротеинов вируса бешенства (штамм G52), с добавлением алюминия гидроксида (0,6 мг) в качестве адьюванта.

По внешнему виду сухой компонент представляет собой сухую однородную пористую массу от бежевого до светло-желтого цвета, жидкий компонент – бесцветную жидкость с белым осадком, образующим при взбалтывании однородную взвесь.

Компоненты вакцины «Эурикан DHPPI<sub>2</sub>-LR» расфасованы по 1 иммунизирующей дозе (1 мл) в стеклянные флаконы соответствующей вместимости. Флаконы герметично укупорены резиновыми пробками, укрепленными алюминиевыми колпачками.

Флаконы с компонентами вакцины упакованы в пластиковые коробки по 10 или 50 иммунизирующих доз. В каждую коробку с вакциной вложена инструкция по ее применению.

3. Срок годности вакцины 24 месяца с даты выпуска при соблюдении условий хранения и транспортирования. По истечении срока годности вакцина к применению не пригодна.

4. Вакцину хранят и транспортируют в сухом темном месте при температуре от 2 до 8°C. Вакцина не подлежит замораживанию.

5. Вакцину следует хранить в местах, недоступных для детей.

6. Компоненты вакцины во флаконах без маркировки, с нарушением целостности и/или герметичности укупорки, с измененным цветом и/или консистенцией содержимого, с наличием посторонней примеси, с истекшим сроком годности, не использованные в течение 30 минут после вскрытия, бракуют и обеззараживают путем кипячения в течение 10 минут.

Утилизация обеззараженной вакцины не требует соблюдения специальных мер предосторожности.

**II. БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА**

7. Вакцина Эурикан DHPPI<sub>2</sub>-LR вызывает формирование иммунного ответа у собак против возбудителей чумы плотоядных, инфекционного гепатита, парвовириоза, парагриппа – 2,

лептоспироза и бешенства через 14 дней после вакцинации, продолжительностью не менее 12 месяцев.

В одной иммунизирующей дозе (1 мл) содержится не менее  $10^{4,0}$ CCID<sub>50</sub> аттенуированного вируса чумы; не менее  $10^{2,5}$ CCID<sub>50</sub> аттенуированного аденовируса собак (CAV 2); не менее  $10^{4,9}$ CCID<sub>50</sub> аттенуированного парвовируса собак; не менее  $10^{4,7}$ CCID<sub>50</sub> аттенуированного вируса парагриппа собак типа 2, инактивированные *Leptospira icterohaemorrhagiae* и *Leptospira canicola*; не менее 1 IU гликопротеинов вируса бешенства (штамм G52).

Вакцина безвредна, лечебными свойствами не обладает.

### III. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

8. Вакцина предназначена для иммунизации собак против чумы, инфекционного гепатита, парвовируса, парагриппа-2, лептоспироза и бешенства.

9. Запрещено иммунизировать клинически больных и/или ослабленных животных, беременных сук после первой трети беременности. За 10 дней до вакцинации необходимо провести дегельминтизацию собаки.

10. Вакцинации подлежат собаки, начиная с 12-недельного возраста. Вакцину вводят подкожно однократно за 3-5 недель до или после введения вакцины ДНПП<sub>2</sub>-L, в дозе 1 мл независимо от массы тела и породы собаки.

Ревакцинацию проводят ежегодно в той же дозе.

При вакцинации необходимо соблюдать правила асептики и антисептики. Перед применением содержимое флакона с жидким компонентом взбалтывают и вносят во флакон с лиофилизированным компонентом, тщательно перемешивают до полного растворения сухого компонента. Для вакцинации используют стерильные шприцы и иглы.

11. Симптомов проявления чумы, аденовириозов, парвовируса, парагриппа-2, лептоспироза и бешенства собак или других патологических признаков при передозировке вакцины не установлено.

12. Особенности поствакцинальной реакции при первичной и последующих иммунизациях не установлено.

13. Следует избегать нарушений схемы проведения вакцинации, поскольку это может привести к снижению эффективности иммунопрофилактики чумы, аденовириозов, парвовируса, парагриппа-2, лептоспироза и бешенства собак. В случае пропуска очередного введения необходимо провести иммунизацию как можно скорее.

14. На месте инъекции возможно появление быстро исчезающей припухлости. При возникновении анафилактической реакции проводят симптоматическое лечение.

15. Не допускается применение вакцины Эурикан ДНПП<sub>2</sub>-LR одновременно с другими вакцинами и препаратами других групп.

16. Сроки возможного использования продукции животного происхождения после введения вакцины Эурикан ДНПП<sub>2</sub>-LR не устанавливаются.

### IV. МЕРЫ ЛИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ

17. При работе с вакциной следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными средствами ветеринарного назначения.

18. Все лица, участвующие в проведении вакцинации, должны быть одеты в спецодежду и обеспечены индивидуальными средствами защиты. В местах работы должна быть аптечка первой доврачебной помощи.

19. При попадании вакцины на кожу и/или слизистые оболочки их промывают чистой водой. При случайном введении вакцины человеку, место инъекции необходимо обработать антисептиком (5 % -ным раствором йода или 70 % раствором этилового спирта) и обратиться в медицинское учреждение.

20. Организация-производитель компания «Merial», 29 av. Tony Garnier, 69007, Lyon, France. Адрес места производства «Merial», Laboratoire Porte des Alpes, 69800 Saint Priest, France.

Инструкция разработана компанией «Merial» (Франция) и Бизнес-подразделением Мериал (г. Москва).

С утверждением настоящей инструкции утрачивает силу инструкция по применению вакцины Эурикан DHPPI<sub>2</sub>-LR, утвержденная заместителем Руководителя Россельхознадзора 11 сентября 2013 г.

Рекомендовано к регистрации в Российской Федерации ФГБУ «ВГНКИ».  
Номер регистрационного удостоверения 250-1-29.12-1090№ПВИ-1-5.1/00938