



Заместитель Руководителя
Россельхознадзора

Е.А. Непоклонов

Январь 2012

ИНСТРУКЦИЯ
по применению Фронтлайн Спрея
для борьбы с эктопаразитами собак и кошек
(организация-разработчик: компания Merial, Франция)

I. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата: Фронтлайн Спрей (Frontline Spray).
Международное непатентованное наименование: фипронил.
2. Лекарственная форма: раствор для наружного применения. Фронтлайн Спрей в 100 мл в качестве действующего вещества содержит фипронил – 0,25 г и вспомогательные вещества: коповидон – 2 г, изопропанол – 80 мл и воду очищенную – до 100 мл.
По внешнему виду препарат представляет собой бесцветную прозрачную жидкость.
3. Выпускают Фронтлайн Спрей расфасованным по 100 и 250 мл в полиэтиленовые флаконы соответствующей вместимости с распылительной головкой.
4. Хранят лекарственный препарат в упаковке производителя, отдельно от пищевых продуктов и кормов, в защищенном от прямых солнечных лучей месте, вдали от нагревательных приборов и источников огня, при температуре от 0 °С до 25 °С.
Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения – 2 года с даты производства.
- Запрещается использовать лекарственный препарат по истечении срока годности.
5. Фронтлайн Спрей следует хранить в недоступном для детей месте.
6. Неиспользованный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства

II. Фармакологические свойства

7. Фронтлайн Спрей относится к инсектоакарицидным препаратам группы фенилпирозолов.

Активен в отношении паразитирующих на собаках и кошках вшей, блох, власоедов и иксодовых клещей.

Механизм действия фипронила, входящего в состав препарата, заключается в блокировании ГАМК-зависимых рецепторов членистоногих, нарушении передачи нервных импульсов, что приводит к параличу и гибели эктопаразитов.

После нанесения препарата на кожно-волосую покров фипронил практически не всасывается в системный кровоток, накапливается в шерсти, эпидермисе, волосяных луковицах и сальных железах тела животного и, оказывая длительное контактное инсектоакарицидное и репеллентное действие, обеспечивает защиту животного от эктопаразитов.

Защитное действие препарата после обработки собак против иксодовых клещей продолжается до 3-5 недель, против блох – 1-3 месяцев, после обработки кошек против блох – до 40 дней.

Фронтлайн Спрей по параметрам острой токсичности при пероральном введении и накожном нанесении относится к низко токсичным препаратам, в рекомендуемых дозах не оказывает кожно-раздражающего и резорбтивно-токсического действия, при попадании в

глаза вызывает слабое раздражение. Препарат токсичен для кроликов, а также рыб и других гидробионтов.

III. Порядок применения

8. Фронтлайн Спрей назначают собакам и кошкам при энтомозах и поражении иксодовыми клещами, а также для предотвращения нападения эктопаразитов на животных.

9. Противопоказанием к применению является повышенная индивидуальная чувствительность животного к ингредиентам препарата (в том числе в анамнезе).

Запрещается применение Фронтлайн Спрея больным инфекционными болезнями, выздоравливающим и ослабленным животным, а также щенкам и котятм моложе 2-дневного возраста.

10. Обработку животных проводят на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении при открытых окнах (форточках), предварительно удалив из помещения клетки с декоративными птицами и накрыв аквариумы с рыбами. Для предотвращения слизывания препарата животному надевают намордник, шейный воротник или фиксируют челюсти петлей из тесьмы, которые снимают после полного высыхания шерстного покрова.

Перед использованием флакон с препаратом тщательно встряхивают и, держа его вертикально, нажимают на распылительную головку, направляя факел аэрозоля на обрабатываемую поверхность с расстояния 10-20 см. Доза препарата в зависимости от длины шерсти составляет 3-6 мл на 1 кг массы животного.

Препарат легко дозируется:

- одно нажатие на распылительную головку флакона вместимостью 100 мл обеспечивает дозу препарата 0,5 мл;

- одно нажатие на распылительную головку флакона вместимостью 250 мл обеспечивает дозу препарата 1,5 мл.

Спреем обрабатывают все туловище животного против роста волос, слегка увлажняя шерсть (у животных длинношерстных пород шерсть приподнимают рукой). Прикрыв глаза животного, обрабатывают ушные раковины и грудь, кончиками пальцев (в перчатке) препарат слегка втирают вокруг глаз и носа.

В целях предотвращения повторной инфекации животных блохами подстилки заменяют или обрабатывают инсектицидным средством в соответствии с инструкцией по его применению.

До полного высыхания шерсти не следует подпускать обработанное животное к открытому огню и нагревательным приборам.

Не рекомендуется мыть животное за 2 дня до обработки, а также мыть и купать в открытом водоеме в течение 2 дней после обработки Фронтлайн Спреем.

11. При передозировке у животного может наблюдаться избыточное слюноотделение, мышечная дрожь, рвота. В этом случае препарат смывают водой с моющим средством, животному назначают антигистаминные препараты и средства симптоматической терапии.

12. Особенности действия лекарственного препарата при его первом применении и отмене не выявлено.

13. Следует избегать нарушений схемы применения препарата, так как это может привести к снижению его эффективности. В случае пропуска очередной обработки ее следует провести как можно скорее в той же дозе.

14. При применении препарата в соответствии с настоящей инструкцией побочных явлений и осложнений у животных, как правило, не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности и появлении аллергических реакций, препарат следует смыть водой с моющим средством и при необходимости назначить антигистаминные препараты.

15. Фронтлайн Спрей не следует применять совместно с другими инсектоакарицидными средствами для обработки животных.

16. Фронтлайн Спрей не предназначен для обработки продуктивных животных.

IV. Меры личной профилактики

17. При проведении лечебно-профилактических мероприятий с использованием Фронтлайн Спрея следует использовать спецодежду, резиновые перчатки и респиратор (марлевую повязку). Во время работы с препаратом не разрешается курить, пить и принимать пищу. По окончании работы следует тщательно вымыть руки теплой водой с мылом, вымыть и просушить перчатки.

18. В течение 24 часов после обработки животное не следует гладить и подпускать к маленьким детям.

Любям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с Фронтлайн Спреем. При случайном попадании препарата на кожу его необходимо немедленно смыть водой с мылом; при попадании в глаза – промыть их в течение нескольких минут проточной водой. В случае появления аллергических реакций и/или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению или этикетку).

19. Запрещается использовать пустые флаконы из-под лекарственного препарата для бытовых целей. Их помещают в полиэтиленовый пакет и утилизируют с бытовыми отходами.

20. Организация – производитель: компания Merial; 29 av. Tony Garnier, 69007, Lyon, France. Адрес места производства: Merial, 4 chemin du Calquet, 31057 Toulouse, France.

Инструкция разработана компанией Merial; 29 av. Tony Garnier, 69007, Lyon, France совместно с Московским Представительством компании «Мериал» 109147, г. Москва, ул. Таганская, д. 17-23

С утверждением настоящей инструкции утрачивает силу инструкция по применению Фронтлайн Спрея, утвержденная Россельхознадзором 8 августа 2006 года

Рекомендовано к регистрации в Российской Федерации ФГБУ «ВГНКИ».

Номер регистрационного удостоверения 250-3-31.11-0550 № ПБУ-3-2.0-00325