

ПИРОДОГ®

10 лет применения в Европе противопаразитарной вакцины показали, что ВАКЦИНАЦИЯ ПРИНОСИТ БОЛЬШУЮ ПОЛЬЗУ:

МНЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Источник: Опрос Merial среди практикующих ветеринарных врачей

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Свыше 80%

Легкая форма течения заболевания

ВЛАДЕЛЬЦЫ

Стремятся получить больше информации

Оценивают риск и дают согласие


НЕУДАЧИ

Малочисленные

Легко переносятся при своевременном принятии мер

Постоянный рост числа животных, вакцинируемых против пироплазмоза

Динамика продаж **пиродог** в сравнении с другими вакцинами для собак на момент запуска вакцины во Франции.



Эффективный приобретенный специфический иммунитет


Тестирование эффективности вакцины (развитие иммунитета): лаборатория паразитологии Rhone Merieux, д-р К.Борингер



"Иммунитет развивается вследствие выздоровления: если собака выздоравливает после спонтанного или экспериментального заражения полевым штаммом, она становится невосприимчивой к нему и не дает никакой реакции на введение в кровь его возбудителя, даже в дозах, смертельных для контрольных особей". Э. Нокар, 1902 г.

Вакцины на основе экзоантигенов угнетают активность B.canis и снижают интенсивность проявления симптомов

Изменения гематокрита в Д0 после теста на эффективность вакцины



Снижение тяжести симптомов не исключает паразитемии

Щенки в возрасте от 5 месяцев

65%


65% случаев заболевания пироплазмозом у собак с данным заболеванием в анамнезе



Предпочтительна вакцинация щенков, не имевших контакта с возбудителем пироплазмоза (бабезиоза)

Вакцинация вне сезонных пиков заболеваемости

Число случаев заболевания пироплазмозом у невакцинированных собак в различные месяцы года (средние значения за 3 года, полученные в питомнике сухопутных войск)



65%

70% неудач имели место у собак, вакцинированных в сентябре, октябре, ноябре. В группе собак, вакцинированных в июне, июле и августе, процент неудач был низким (менее 2%).



Схема вакцинации

ЗУРИКАН® ДНРРi₂-L ЗУРИКАН® ДНРРi₂-L + Рабизин ПИРОДОГ® ПИРОДОГ® ПИРОДОГ® ЗУРИКАН® ДНРРi₂-L-R



Для щенков

Прежде всего проводится прививка щенков по классической схеме поливалентными вакцинами против основных инфекционных заболеваний (в возрасте 2-3 месяцев). Впоследствии начиная с 5-ти месячного возраста проводят вакцинацию Пиродогом.



Для взрослых собак

Очень важно вести историю пациента, чтобы своевременно предупредить владельца о снижении эффективности вакцины, если собака вступала в контакт с *Babesia canis canis*.



КАК ПОЗИЦИОНИРОВАТЬ ВАКЦИНУ ПИРОДОГ® ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Источник: Опрос Merial среди практикующих ветеринарных врачей

- 1 Для того, чтобы наилучшим образом защитить вашу собаку от пироплазмоза, необходимо сочетать вакцинацию с мерами против эктопаразитов с регулярными осмотрами животного.
- 2 **ПИРОДОГ®** - это противопаразитарная вакцина.
- 3 Это единственная на Российском рынке вакцина против пироплазмоза (бабезиоза) собак.
- 4 Ее эффективность составляет 80%.
- 5 Собака может заболеть пироплазмозом (бабезиозом) и после вакцинации, но в этом случае болезнь, как правило, протекает легче.
- 6 Рекомендуется вакцинировать собаку с 5-месячного возраста.



ПИРОДОГ

ВАКЦИНА ПРОТИВ ПИРОПЛАЗМОЗА



80% защиты
лучше чем 100% риска

ОТ MERAL
СПЕЦИАЛИСТОВ
ПО СОЗДАНИЮ ВАКЦИН

