

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Руководителя
Россельхознадзора
_____ Н.А. Власов

ИНСТРУКЦИЯ
по применению вакцины Рувакс
для профилактики рожи свиней, овец и домашней птицы (индейки, фазаны, утки)
инактивированная
(организация - разработчик компания " Мериал " /"Merial", Франция)

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Торговое наименование - Вакцина Рувакс (Ruvax)

Международное непатентованное наименование – Вакцина против рожи свиней, овец и домашней птицы (индейки, фазаны, утки) инактивированная.

2. Лекарственная форма – суспензия для инъекций. Вакцина изготовлена из лизированных раствором гидроксида натрия бактериальных клеток *Erysipelothrix rhusiopathie* (серотип 2), с добавлением адъюванта – гидроокиси алюминия 2,1 мг/мл, консерванта - тиомерсала – не более 0,1 мг/мл, и раствора хлорида натрия до 1 см³.

По внешнему виду вакцина представляет собой суспензию молочно-белого цвета. При хранении вакцины допускается выпадение осадка, который легко ресуспендируется при взбалтывании.

Вакцина расфасована по 10, 25, 50 и 250 мл во флаконы соответствующей вместимости, укупоренные резиновыми пробками укрепленными алюминиевыми колпачками.

3. Флаконы упакованы в коробки. В каждую коробку вложена инструкция по применению вакцины на русском языке.

Срок годности вакцины - 24 месяца с даты выпуска при соблюдении условий хранения и транспортирования. По истечению срока годности вакцина к применению не пригодна.

4. Вакцину хранят и транспортируют в сухом темном месте при температуре от 2 до 8° С.

5. Вакцину следует хранить в местах, недоступных для детей.

6. Вакцину во флаконах без этикеток, с истекшим сроком годности, с нарушением целостности и/или герметичности укупорки, с измененным внешним видом, не использованная в течение 4 часов после вскрытия флаконов бракуют, обеззараживают кипячением в течение 30 минут или обработкой 2% раствором щелочи или 5% раствором хлорамина (1:1) в течение 30 минут и утилизируют.

Утилизация обеззараженной вакцины не требует соблюдения специальных мер предосторожности.

II. БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

7. Вакцина вызывает формирование иммунного ответа у свиней, овец и домашней птицы (индейки, фазаны, утки) к возбудителю рожи через 10-14 суток после двукратного введения продолжительностью 6 месяцев.

В 1 мл вакцины содержится не менее 25 IU (эквивалентно 1 Ед.ИФА).
лизированных бактериальных клеток *Erysipelothrix rhusiopathie* (серотип 2).

Вакцина безвредна, лечебными свойствами не обладает.

III. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

8. Вакцина предназначена для профилактики рожи свиней, овец и домашней птицы в благополучных и угрожаемых по данной болезни хозяйствах.

9. Запрещено иммунизировать клинически больных и/или ослабленных животных.

10. Вакцинации подлежат свиньи, овцы, домашняя птица (индейки, фазаны, утки – родительское стадо).

Свиньям вакцину вводят подкожно или внутримышечно за ухом в дозе 2 см³, по следующей схеме:

- ремонтный молодняк и родительское стадо: первичная вакцинация - 2 инъекции с интервалом 3-4 недели перед осеменением. Ревакцинацию свиноматок проводят в конце каждого периода лактации или в течение последнего месяца супоросности; хряков – не позднее, чем за 3 недели до случки;

- поросята на откорме: 2 инъекции с интервалом 3-4 недели, начиная с 10-недельного возраста.

Суягным овцам вакцину вводят в дозе 2 см³ подкожно по следующей схеме:

- первичная вакцинация: 2 инъекции с интервалом 3-4 недели; реакция – 1 инъекция в течение последней трети суягности.

Домашней птице вакцину вводят подкожно в дозе 0,5 см³ однократно, начиная с 8-недельного возраста; ревакцинируют в той же дозе перед началом яйцекладки.

Перед применением вакцину выдерживают в течение 6-8 часов при температуре 20⁰С - 22⁰С и перемешивают энергичным встряхиванием. Во время проведения вакцинации флакон с вакциной периодически встряхивают для восстановления однородности эмульсии.

Шприцы и иглы стерилизуют кипячением. Поверхность кожи на месте введения вакцины дезинфицируют 70%-ным этиловым спиртом. Для каждого животного используют отдельную стерильную иглу.

11. Симптомов проявления рожи или других патологических признаков при передозировке вакцины не установлено.

12. Особенности поствакцинальной реакции при первичной и последующих введениях вакцины не установлено.

13. Следует избегать нарушений схемы и сроков проведения вакцинации, поскольку это может привести к снижению эффективности иммунопрофилактики рожи. В случае пропуска очередного введения вакцины необходимо провести иммунизацию как можно скорее.

14. При применении вакцины в соответствии с настоящей инструкцией побочных явлений и осложнений, как правило, не отмечается. У отдельных животных в месте инъекции возможно образование припухлости, самопроизвольно исчезающей в течение 7 суток. В случае появления аллергических реакций проводят симптоматическое лечение антигистаминными препаратами.

15. Запрещается применять вакцину против рожи свиней, овец и домашней птицы (индейки, фазаны, утки) инактивированную одновременно с другими иммунобиологическими препаратами.

16. Продукты убоя и мясо от вакцинированных животных реализуют без ограничения независимо от сроков вакцинации.

IV. МЕРЫ ЛИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ

17. При работе с вакциной следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными средствами ветеринарного назначения.

18. Все лица, участвующие в проведении вакцинации должны быть одеты в спецодежду (резиновые сапоги, халат, брюки, головной убор, резиновые перчатки) и обеспечены индивидуальными средствами защиты: очками закрытого типа. В местах работы должна быть аптечка первой доврачебной помощи.

19. При попадании вакцины на кожу и/или слизистые оболочки их рекомендуется промыть большим количеством чистой воды. При случайном введении препарата человеку, место введения необходимо обработать 70 % раствором этилового спирта, обратиться в медицинское учреждение и сообщить об этом врачу.

20. Организация-производитель компания «Merial» 29 av. Tony Garnier, 69007, Lyon, France

Адрес места производства “Merial”, rue de l’aviation, 69800 Saint Priest, France.

Инструкция по применению вакцины «Рувакс» разработана компанией «Merial», 29 av. Tony Garnier, 69007, Lyon, France совместно с Московским Представительством компании «Мериал С.А.С.», г. Москва.

С утверждением настоящей инструкции утрачивает силу инструкция по применению вакцины Рувакс против рожи свиней, овец и домашней птицы (индейки, фазаны, утки) инактивированной, утвержденная 07.07..2009 года.

Рекомендовано к регистрации в Российской Федерации ФГУ «ВГНКИ»