

ИНСТРУКЦИЯ
по применению вакцины Пестиффа
для профилактики классической
чумы свиней (китайский штамм) с растворителем.
(организация - производитель фирма "Мериал" /"Merial", Франция)

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Пестиффа (Pestiffa) модифицированная живая вакцина для профилактики классической чумы свиней.
2. Препарат изготовлен из китайского штамм CL вируса классической чумы свиней не менее 100 Pig PD₅₀, лактозы 27 мг, разбавитель- специальный стерильный буферный раствор, содержащий фосфаты.
3. По внешнему виду вакцина представляет собой лиофилизированную массу белого цвета, а разбавитель – прозрачную жидкость.
4. Вакцину расфасовывают во флаконы, 10, 25 и 50 доз, а разбавитель, во флаконы по 20, 50 и 100 см³. Флаконы с вакциной и растворителем укупоривают под вакуумом резиновыми пробками укрепленными алюминиевыми колпачками. Каждая единица фасовки снабжена этикеткой, на которой указаны: наименование и адрес фирмы- изготовителя и ее товарный знак, наименование вакцины, кол-во доз, объем, способ введения, номер серии, срок годности, надпись: «для животных», «стерильно».
5. Вакцину хранят и транспортируют при температуре от 2 до 8° С в сухом темном месте, предохраняя от прямых солнечных лучей. Срок годности вакцины при соблюдении условий хранения и транспортировки – 36 месяцев. Вакцина, подвергшаяся замораживанию, а также с истекшим сроком годности к применению не пригодна.
6. Флаконы с вакциной без этикеток, с нарушением целостности укупорки, подвергшиеся замораживанию, содержащие посторонние примеси, с измененным цветом и консистенцией, а также неиспользованные при вакцинации подвергаются утилизации.

II. БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ВАКЦИНЫ

7. Вакцина Пестиффа вызывает формирование иммунного ответа против классической чумы свиней. Иммунитет формируется через 3 недели после ревакцинации и сохраняется в течение 2-х лет.

III. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ВАКЦИНЫ

8. 3.1. Вакцина Пестиффа предназначена для активной иммунизации свиней против классической чумы свиней (КЧС). Вакцину применяют в комплексе с общими эпизоотическими мероприятиями.
9. Вакцину Пестиффа применяют с профилактической целью при иммунизации против КЧС в благополучной зоне, а также в угрожаемых и неблагополучных по КЧС хозяйствах.
10. Вакцину Пестиффа растворяют только в фирменном стерильном растворителе, предохраняя от прямых солнечных лучей, из расчета 2 см³ растворителя на 1 дозу вакцины. Для этого, соблюдая правила асептики, шприцем набирают 2-4 см³ растворителя и вносят во флакон с вакциной. Тщательно перемешивают вакцину путем пропускания раствора 3-4 раза через шприц. Растворенную вакцину переносят во флакон с растворителем и перемешивают. Оставшийся на стенках флакона с вакциной препарат смывают дополнительным промыванием. Вакцину применяют сразу после растворения. Не использованную в течение двух часов вакцину и пустые флаконы обеззараживают кипячением в течение 30 минут.
11. Вакцинации подлежат поросята, хряки-производители и свиноматки. Вакцину Пестиффа вводят только клинически здоровым свиньям строго внутримышечно в области шеи за ухом в объеме 2 см³. При вакцинации соблюдают правила асептики и антисептики.
12. Вакцинация хряков-производителей и свиноматок проводится один раз в два года. Свиноматок и хряков вакцинируют за 15-30 дней до случки.

13. Вторую инъекцию для подсвинков проводят в зависимости от дальнейшего использования животных: а) свиней, предназначенных на откорм, вакцинируют через 2 месяца после первой вакцинации; б) свиней, предназначенных на воспроизводство (ремонтные свинки), вакцинируют не позднее одного месяца до наступления охоты, далее согласно пункту 12.

14. Поросят, родившихся от невакцинированных против КЧС свиноматок, при благоприятной эпизоотической ситуации первый раз вакцинируют, начиная с 7-суточного возраста, далее согласно пунктам 12 и 13.

15. Просят, родившихся от вакцинированных свиноматок, при благоприятной эпизоотической ситуации первый раз вакцинируют, начиная с 43-дневного возраста, далее согласно пунктам 12 и 13.

16. Просят, родившихся от вакцинированных свиноматок, при неблагоприятной эпизоотической ситуации первый раз вакцинируют, начиная с 30-суточного возраста, далее согласно пунктам 12 и 13.

Ревакцинация взрослого поголовья – 1 раз в 2 года или в соответствии с ветеринарным законодательством.

17. В исключительных случаях вакцинируют все поголовье, включая супоросных свиней.

В неблагополучном по КЧС пункте или хозяйстве после вакцинации возможны заболевание и падеж тех животных, которые уже были инфицированы вирусом КЧС и находились в инкубационном периоде заболевания.

18. При введении вакцины супоросным и лактирующим животным негативных эффектов отмечено не было. Ограничений по использованию мяса вынужденно убитых вакцинированных свиней не имеется. Перегруппировки вакцинированных свиней и передача их в другие хозяйства разрешается не ранее 14 суток после прививки.

IV. МЕРЫ ЛИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ

19. При работе с вакциной следует соблюдать правила работы с инъекционными ветеринарными препаратами. По окончании работы вымыть руки теплой водой с мылом.

20. При случайной инъекции вакцины человеку необходимо немедленно обратиться к врачу.

21. Вакцину следует хранить в недоступном для детей месте.

Инструкция разработана фирмой «Мериал» Франция
Организация-производитель фирма «Мериал»
Адрес: 69007, 29 авеню Тони Гариньер, Лион, Франция
69007, 29 av. Tony Garnier, Lyon, France